


FALCON
Forte



Falcon Forte EC 425

**Laia toimespektriga fungitsiid teravilja
kaitsmiseks haiguste eest varajases
kasvujärgus**




Bayer CropScience

FALCON VS FALCON FORTE



	Spiroksamiin	Tebukonasool	Triadimenool	Protiokonasool*
FALCON	250 g/l	167 g/l	43 g/l	
FALCON FORTE	224 g/l	148 g/l		53 g/l

*Protiokonasool: kõige laiema spektriga triasool teraviljadele



Falcon'ilt Falcon Forte'le: kolmekordne mõju veelgi parem



Bayer CropScience

NISU HAIGUSTE SPEKTER



**Erysiphe
graminis
JAHUKASTE**



**Drechslera
tritici-repentis
NISU-
PRUUNLAIKSUS**



**Septoria tritici
HELELAIKSUS
LEHTEDEL**




**Septoria nodorum
HELELAIKSUS
VILJAPEADEL**



**Puccinia
recondita
NISU -
PRUUNROOSTE**

JAHUKASTE – 2 PRITSIMIST BBCH 30-32, 55-59

efektiivsus 21 p pärast pritsimist, 2007, 1 KATSE



F. Forte 0,6 = Falcon 0,6; F. Forte 0,8 – pikem kaitseaeg




Bayer CropScience

NISU-PRUUNLAIKSUS (DTR) – talinisu

Kontroll - haiguse esinemine %. Pritsitud BBCH 30-32 ja BBCH 55-59


Efektiivsus hinnatud 20 p pärast 2. pritsimist, 1 katse, 2008



ORDA HAIGUSTE SPEKTER

FALCON


Forte



Dreschlera teres
VÖRKLAIKSUS



Erysiphe graminis
JAHUKASTE



Rhynchosporium
ÄÄRISLAIKSUS



Ramularia collo-cygni
RAMULAARIA



Puccinia hordei
ODRA-
PRUUNROOSTE





Bayer CropScience

Erinevused haiguslike ja mittehaiguslike
lehelaiksuste vahel, sh ramulaaria ja füsioloogiliste
lehelaiksuste vahel




VÕRKLAIKSUS – suvioder, 1 pritsimine 32-47
efektiivsus 21 p pärast pritsimist, haigusintensiivsus 76%,
2007, 2 katse keskmine, LV, LT

FALCON
Forte



Bayer CropScience

SAAK – TALI- JA SUVINISU, lisasaak %
2 PRITSIMIST BBCH 30-32, 55-59
KONTROLL- 6,1 t/ha , 2007, 3 katse keskmine



KASUTAMINE



- Kõik teraviljad
- Kulunorm 0,6 – 0,8 l/ha
- Teraviljade lehti kahjustavad haigused
- Lisaks pähikuhaigused
 - Helelaikusid lehtedel (*Septoria tritici*), Helelaikusid viljapeadel (*Septoria nodorum*), Nisu-triipõvik (*Drechslera tritici repentis*), Jahukaste (*Erysiphe graminis*), Nisu kollane rooste (*Puccinia striiformis*), Nisu pruunrooste (*Puccinia recondita*), Äärislaikusid (*Rhynchosporium secalis*), Vörklaikusid (*Pyrenophora teres*), Odra leherooste (*Puccinia hordei*), Ramulaaria (*Ramularia collo-cygni*), Füsioloogilised lehelaikusid



Protiokonasool parandab efektiivsust:

**nisu, tritikale -
oder, rukis –**

Nisu-pruunlaikusid, septorioos lehtedel ja pähikul
vörklaikusid, äärislaikusid, ramulaaria



Bayer CropScience

KASUTAMINE



- Töölahuse kulu: 100-400 l/ha
- MAX 2 pritsimist hooajal
- Vihmakindlus: 1 tund kuni pritsimislahus on lehtedel kuivanud
- Minimaalne õhutemperatuur pritsimise ajal:
 - + 5°C jahukaste tõrjeks;
 - + 12°C kõikide teiste haiguste tõrjeks



Bayer CropScience

FUNGITSIIDIDE VALIK ODRAL



T1




T2



T3



FUNGITSIIDIDE VALIK NISUL



Falcon Forte
0,6 – 0,8 l/ha

Input
0,8 – 1,0 l/ha

T1



Fandango
0,8 – 1,0 l/ha

Zantara 0,9-1,2

T2




Folicur
0,75 – 1,0 l/ha

Prosaro
0,75 – 1,0 l/ha

1,5

T3

FALCON
Forte



Falcon Forte EC 425

*Veelgi tugevam kolmekordne
mõju haiguste vastu*



Bayer CropScience