

Suvioder

Wolmari

- * Varajane
- * Kõrge saagikusega
- * Keskmise 1000 tera massiga 40-43g
- * Hea seisukindlusega
- * Tugeva kõrrega
- * Haiguskindel
- * Mahukaal keskmine kuni hea
- * Kasvab hästi ka happelistel muldadel

Soovituslik külvinorm 400 id tera m²

Optimaalne külviaeg aprilli keskel-mai algus või esimesel võimalusel*

Saagi suurendamiseks ja kvaliteedi parandamiseks tuleks seemneid puhtida.

Sort	Saagikus	Kasvuaeg	Pikkus	1000 tera mass	Proteiin %	Mahukaal	Lamandumise %
Wolmari	5867	85	73	41	11,9	663	18
Voitto	5084	85	77	41	12,3	632	19
Pilvi	4794	85	77	41	13,2	638	21
Tiril	5305	86	76	40	12,7	636	18
Vilde	5608	89	73	42	12,2	639	7
Jyvä	5245	89	76	42	12,4	666	27

Eesti riiklikud katsed 2011-2013 haigustele vastuvõtlikuse suhtes			
Sort	Vörklaikusus	Äärislaikusus	Pruunlaikusus
Annabel	2,8	2	3
Vilde	3	1,2	2,5
Anni	2,6	1,2	2,6
Soome riiklikud katsed 2011-2013			
Wolmari	1	0,5	3

Sordiaretaja: Soome Boreal Plant Breeding Ltd.